




*Discoglossus pictus*. Aiguamolls de l'Empordà, Gerona, 01.04.91 (Salvador Domenech).

*Discoglossus pictus* (Otth, 1837)  
 Sapillo pintojo, Sapinho sarapintado  
 Granota pintada (C)

Se distribuye actualmente por el norte de Africa (Marruecos, Argelia y Túnez), Malta y Sicilia. La distribución de esta especie en la Península Ibérica se circunscribe a Cataluña y su presencia no puede ser explicada más que por una introducción muy reciente. Todos los datos disponibles indican que esta especie fue introducida a finales del siglo pasado o principios del actual en la zona de Banyuls de la Marenda. La primera cita corresponde a Wintrebert, que refiere su descubrimiento en 1906. Posteriormente esta especie se extendió hacia el norte hasta Narbona (1979), otras localidades de los Pirineos Orientales (1987) así como en localidades de los departamentos franceses del Aude y del Hérault. La penetración hacia el sur ha sido más notable.

La distribución ibérica es reducida pues ocupa, tan sólo, trece cuadrículas correspondientes a la provincia de Gerona y concretamente las comarcas de l'Alt i Baix Empordà, el Plà de l'Estany y el Gironès. Esta distribución refleja la realidad ya que no se observan vacíos dignos de mención. En la bibliografía pueden encontrarse citas muy apartadas de su actual área de distribución como son las de Olesa de Montserrat, Cubelles y Bellaterra, en Cataluña. Las dos primeras se han de considerar como errores de identificación y la tercera corresponde a un ejemplar escapado de cautividad. También ha sido citado en las provincias de Castellón y Alicante, pero estas citas han de considerarse errores de identificación.

El Sapillo pintojo se localiza principalmente a baja altitud (media de 52 m) con un rango que



*Discoglossus pictus.*

oscila desde el nivel del mar hasta los 500 m. Tiene preferencia por un relieve moderado o bajo. En su área de distribución se registran unos valores de pluviosidad anual medios o altos (600 a 900 mm) y temperaturas comprendidas entre los 14 y 15°C de media anual.

Como se trata de una especie de introducción reciente y en expansión, es difícil hacer consideraciones sobre sus límites biogeográficos y sus limitaciones ecológicas. Se ha localizado en biotopos típicamente mediterráneos. Ocupa tanto las marismas como los encinares, alcornoques, bosques de ribera, choperales y prados. En todos los casos se encuentra en las proximidades del agua, frecuentemente en charcos y zonas inundadas, charcas y en márgenes de cursos de agua. La cobertura arbórea no representa ninguna limitación aunque prefiere el sustrato herbáceo con arbolado. Resiste muy bien el agua salobre, habiendo sido encontrado en la misma costa. Las larvas se desarrollan en cualquier punto de agua, siempre que la corriente no sea muy fuerte. Se han observado larvas en acequias, canales de riego, riachuelos, charcas naturales e incluso en charcos formados por agua de mar con alta salinidad.

Las poblaciones de Sapillo pintojo son abundantes y muestran, puntualmente, densidades altas. No se han detectado problemas, ni en la especie, ni en los ambientes naturales que ocupan que puedan afectar a su estatus actual.

La subespecie del Sapillo pintojo presente en la Península Ibérica es *Discoglossus pictus algirus* como corresponde a una introducción realizada a partir de ejemplares procedentes de Argelia.

Referencias más significativas: Capula *et al.* (1985), Knoepffler (1962), Lanza (1989), Lanza *et al.* (1986), Llorente *et al.* (1995).

*Gustavo A. Llorente, Albert Montori, Xavier Santos y Miguel A. Carretero*